

IDAPTAN[®]
Trimetazidina

COMPOSICION

Solución bebible, composición centesimal.

Principio Activo: Trimetazidina (D.C.I.) Diclorhidrato 2 g.

Excipientes: Agua purificada, Parahidroxibenzoato de metilo (E-218), Parahidroxibenzoato de propilo (E-216), Propilenglicol, en c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES

- **En otorrinolaringología:** trastornos cócleo - vestibulares de origen isquémico, como vértigos, acúfenos e hipoacusias.
- **En oftalmología:** déficits retinianos de origen verdaderamente isquémico.

PRECAUCIONES

Aunque no se ha observado ningún efecto embriotóxico o teratogénico en el curso de la experimentación animal, se debe evitar la prescripción durante los tres primeros meses del embarazo salvo indicación concreta del médico.

INTERACCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Se recomienda evitar su asociación con I.M.A.O., a pesar de no existir evidencia de interacción.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En raras ocasiones, alteraciones gastrointestinales leves: náuseas, vómitos.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se ha observado ningún caso de intoxicación. El elevado margen terapéutico hace difícil los accidentes graves por intoxicación.

Los datos farmacológicos indican que la intoxicación podría manifestarse por bajada de la resistencia periférica con hipotensión y sofocos.

Se instaurará tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562.04.20.

POSOLOGIA

La posología usual es de 20 mg. (1 ml) dos a tres veces al día.

MODO DE EMPLEO

Un medidor dosificador graduado permite administrar el número de ml prescrito (Véase esquema de utilización):

- Empujar hasta el fondo el pistón en el cuerpo del dosificador e introducirlo en el frasco.
- Tirar hacia arriba del pistón hasta la graduación correspondiente al número de ml deseado.
- Empujar el pistón, liberando el contenido del dosificador en medio vaso de agua.
- Después de usado, lavar el dosificador con agua.

PRESENTACION

Frasco de 60 ml dosificados a 20 mg/ml.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

Fabricado por: Laboratorios Servier, S.A.
Avenida de los Madroños, 33 - 28043 Madrid